



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO	:	Baycox® 5% suspensión oral
N° REGISTRO SAG	:	1778
LABORATORIO PRODUCTOR	:	KVP Pharma und Veterinär Produkte GmbH, Alemania
LABORATORIO DISTRIBUIDOR	:	Elanco Chile SPA, Chile
TIPO DE PRODUCTO	:	Coccidicida para cerdos (lechones), bovinos (terneros) y ovejas (corderos).
COMPOSICIÓN	:	Toltrazurilo al 5% en suspensión oral.
INDICACIÓN:		Cerdos: Para la prevención de signos clínicos de coccidiosis en lechones neonatales en granjas con una historia confirmada de coccidiosis causada por <i>Isospora suis</i>. Bovinos: Para la prevención y tratamiento de signos clínicos de coccidiosis y reducción de la propagación de coccidios expulsados por terneros de hasta 9 meses de edad en granjas con una historia confirmada de coccidiosis causada por <i>Eimeria bovis</i>, <i>Eimeria zuernii</i> o <i>Eimeria alabamensis</i>. Ovejas: Para la prevención de signos clínicos de coccidiosis y reducción de propagación de coccidia en corderos de granjas con una historia confirmada de coccidiosis causada por <i>Eimeria crandallis</i> y <i>Eimeria ovinoidalis</i>.
DOSIFICACIÓN	:	Lechones: 20 mg/Kg (0,4 ml/Kg), en dosis única. Terneros: 15 mg/Kg (0,3 ml/Kg), en dosis única. Corderos: 20 mg/Kg (0,4 ml/Kg), en dosis única.
CONSERVACIÓN	:	Conservar entre 5° C y 30° C.
CONTRAINDICACIONES:		No hay si se usa en las dosis indicadas.
PERÍODO DE RESGUARDO	:	Cerdos (lechones): Carne: 77 días. Bovinos (terneros): Carne: 63 días Ovinos (corderos): Carne: 42 días
		No administrar en animales en producción de leche destinada a consumo humano.
PRESENTACIÓN	:	Envases de 250 ml y de 1 litro.